

2011年診断例

2. 部位別・性別登録件数(上位10件)

ICDO3	局在名称	割合	男性		ICDO3	局在名称	割合	女性
C18-20	大腸(結腸、直腸)	25.1%	87	1	C18-20	大腸(結腸、直腸)	19.4%	61
C16	胃	23.9%	83	2	C50	乳房	15.0%	47
C61	前立腺	11.5%	40	3	C53	子宮頸部	15.0%	47
C34	気管支及び肺	8.6%	30	4	C16	胃	10.2%	32
C67	膀胱	7.2%	25	5	C22	肝及び肝内胆管	5.1%	16
C15	食道	4.3%	15	6	C25	膵	5.1%	16
C22	肝及び肝内胆管	2.9%	10	7	C54	子宮体部	4.1%	13
C25	膵	2.0%	7	8	C34	気管支及び肺	3.5%	11
C75	その他の内分泌腺及び関連組織	2.0%	7	9	C73	甲状腺	3.2%	10
C24	その他及び部位不明の胆道	1.7%	6	10	C23	胆のう	2.2%	7

30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

男性

女性

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

