

# Pembrolizumab+CDDP+PEM (非扁平上皮・非小細胞肺癌)

※7日以上前からパンピタン末1g/日連日内服

※7日前から メチコバル注2A筋注 9週間毎

2～4日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

1日目

2～3日目

メインルート				メインルート				
	薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
①	生食 ※インラインフィルター使用	50ml	1V	15分	①	EL3号	500ml 1V	2時間
②	生食 キイトルーダ	100ml 100mg/4mL	1V 2V	30分	②	EL3号	500ml 1V	2時間
③	生食	250ml	1V	1時間	③	EL3号	500ml 1V	2時間
④	生食 プロイメンド	100ml 150mg	1V 1V	30分	④	EL3号	500ml 1V	2時間
⑤	生食 アロキシ デキサート	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml	1V 1V 3A	30分				
⑥	生食 アリムタ	100ml 500mg	1V 500mg/m <sup>2</sup>	10分				
⑦	生食 硫酸Mg補正液	500ml 1mEq/ml	1V 8ml	1時間				
⑧	マンニトールS	300ml	1V	30分				
⑨	生食 シスプラチン	500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml	1V 75mg/m <sup>2</sup>	2時間				
⑩	EL3号	500ml	1V	2時間				

投与期間 3週間ごと 4クール