

PAC+BV (乳癌)

1日目 15日目

| 内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| メインルート | | | |
| 薬剤名 | 規格 | 数量 | |
| ① 生食 ※インラインフィルター使用 | 50ml | 1V | 15分 |
| ② 生食 アバサチン | 100ml 100mg/4ml 400mg/16ml | 1V 10mg/kg | 90分 |
| ③ 生食 | 50ml | 1V | 5分 |
| ④ 生食 デキサート ファモチジン | 100ml 3.3mg/1ml 20mg | 1V 2A 1V | 30分 |
| ⑤ 生食 | 100ml | 1V | 30分 |
| ⑥ 5%TZ パクリタキセル | 250ml 30mg/5ml 100mg/16.7ml | 1V 90mg/m ² | 2時間 |
| ⑦ 生食 | 50ml | 1V | 5分 |

8日目

| 内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用 | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| メインルート | | | |
| 薬剤名 | 規格 | 数量 | |
| ① 生食 デキサート ファモチジン ※インラインフィルター使用 | 100ml 3.3mg/1ml 20mg | 1V 2A 1V | 30分 |
| ② 生食 | 100ml | 1V | 30分 |
| ③ 5%TZ パクリタキセル | 250ml 30mg/5ml 100mg/16.7ml | 1V 90mg/m ² | 2時間 |
| ④ 生食 | 50ml | 1V | 5分 |

投与期間 4週間ごと 重篤な副作用が出現なく、効果が続く限り継続