

GT療法（再発・転移乳癌）

1日目

2～3日目

| 内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用 | | | | 内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後 | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| メインルート | | | | | |
| ① | 薬剤名 生食 ※インラインフィルター使用 | 規格 50ml | 数量 1V | | 15分 |
| ② | 生食 デキサート ファモチジン | 100ml 3.3mg/1ml 20mg | 1V 5A 1V | | 30分 |
| ③ | 生食 アロキシ | 100ml 0.75mg/5ml | 1V 1V | | 30分 |
| ④ | 5%TZ パクリタキセル | 500ml 100mg/16.7ml 30mg/5ml | 1V 175mg/m ² | | 3時間 |
| ⑤ | 生食 ジェムザール ジェムザール | 100ml 200mg 1g | 1V 1250mg/m ² | | 30分 時間厳守！ 時間延長で有害事象増強 |
| ⑥ | 生食 | 50ml | 1V | | 5分 |

8日目

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| メインルート | | | | | |
| ① | 生食 デキサート | 100ml 3.3mg/ml | 1V 2A | | 30分 |
| ② | 生食 ジェムザール ジェムザール | 100ml 200mg 1g | 1V 1250mg/m ² | | 30分 時間厳守！ 時間延長で有害事象増強 |
| ③ | 生食 | 50ml | 1V | | 5分 |

投与期間

3週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続