

PAC+Her毎週(乳癌)

1日目

内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用 メインルート				
	薬剤名	規格	数量	
①	生食 ※インラインフィルター使用	50mL	1瓶	15分
②	生食 ハーセプチン	250mL 150mg 60mg	1袋 4mg/kg	1時間30分
③	生食	50mL	1瓶	5分
④	生食 デキサート ファモチジン	100mL 3.3mg/1mL 20mg/20mL	1瓶 2A 1A	30分
⑤	生食	100mL	1瓶	30分
⑥	5%ブドウ糖注射液 パクリタキセル	250mL 30mg/5mL	1袋 80mg/m ²	2時間
⑦	生食	50mL	1瓶	5分

8日目 15日目

内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用 メインルート				
	薬剤名	規格	数量	
①	生食 ※インラインフィルター使用	50mL	1瓶	15分
②	生食 ハーセプチン	250mL 150mg 60mg	1袋 2mg/kg	1時間30分
③	生食	50mL	1瓶	5分
④	生食 デキサート ファモチジン	100mL 3.3mg/1mL 20mg	1瓶 2A 1A	30分
⑤	生食	100mL	1瓶	30分
⑥	5%ブドウ糖注射液 パクリタキセル	250mL 30mg/5mL	1袋 80mg/m ²	2時間
⑦	生食	50mL	1瓶	5分

22日目

メインルート				
	薬剤名	規格	数量	
①	生食	50mL	1瓶	15分
②	生食 ハーセプチン	250mL 150mg 60mg	1袋 2mg/kg	1時間30分
③	生食	50mL	1瓶	5分

投与期間 4週間ごと重篤な副作用が出現なく、効果が続く限り継続