

Pembrolizumab(6週間隔)+PAC療法(PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌)

1日目、43日目

内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用				
メインルート				
	薬剤名	規格	数量	
①	生食 ※インラインフィルター使用	50mL	1瓶	15分
②	生食 キイトルーダ	100mL 100mg/4mL	1瓶 4V	30分
③	生食	50mL	1瓶	15分
④	生食 デキサート ファモチジン	100mL 3.3mg/1mL 20mg/20mL	1瓶 2A 1A	30分
⑤	生食	100mL	1瓶	30分
⑥	5%ブドウ糖注射液 パクリタキセル	250mL 100mg/16.7mL 30mg/5mL	1袋 90mg/m ²	2時間
⑦	生食	50mL	1瓶	5分

8日目、15日目、29日目、36日目、57日目、64日目、71日目

内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用				
メインルート				
	薬剤名	規格	数量	
①	生食 デキサート ファモチジン ※インラインフィルター使用	100mL 3.3mg/1mL 20mg/20mL	1瓶 2A 1A	30分
②	生食	100mL	1瓶	30分
③	5%ブドウ糖注射液 パクリタキセル	250mL 100mg/16.7mL 30mg/5mL	1袋 90mg/m ²	2時間
④	生食	50mL	1瓶	5分

投与期間 12週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続