

Pembrolizumab (6週間隔)+CBDCA+GEM(PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌)

1日目				2~3日目			
メインルート				内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後			
薬剤名	規格	数量					
① 生食 ※インラインフィルター使用	50mL	1瓶	15分				
② 生食 キイトルーダ	100mL 100mg/4mL	1瓶 4V	30分				
③ 生食	50mL	1瓶	15分				
④ 生食 アロキン デキサート	100mL 0.75mg/5mL 3.3mg/1mL	1瓶 1V 3A	30分				
⑤ 生食 ジェムザール	100mL 1g 200mg	1瓶 1000mg/m ²	30分 時間厳守！ 時間延長で有害事象				
⑥ 5%ブドウ糖注射液 カルボプラチン	250mL 450mg/45mL 150mg/15mL 50mg/5mL	1袋 AUC=2	1時間				
⑦ 生食	50mL	1瓶	5分				

8日目、22日目、29日目				9~10日目、23~24日目、30~31日目			
メインルート				内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後			
薬剤名	規格	数量					
① 生食 アロキン デキサート	100mL 0.75mg/5mL 3.3mg/1mL	1瓶 1V 3A	30分				
② 生食 ジェムザール	100mL 1g 200mg	1瓶 1000mg/m ²	30分 時間厳守！ 時間延長で有害事象				
③ 5%ブドウ糖注射液 カルボプラチン	250mL 450mg/45mL 150mg/15mL 50mg/5mL	1袋 AUC=2	1時間				
④ 生食	50mL	1瓶	5分				

投与期間 6週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続