

# BV+FOLFIRI(大腸癌)

1日目

2～3日目

メインルート				側管			内服	
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	デカドロン錠4mg	2錠 1日1回朝食後
① 生食	50mL	1瓶	15分					
② 生食 ベバシズマブ	100mL 100mg/4mL 400mg/16mL	1瓶 5mg/kg	1時間30分					
③ 生食	50mL	1瓶	5分					
④ 生食 アロキシ デキサート	100mL 0.75mg/5mL 3.3mg/1mL	1瓶 1V 3A	30分					
⑤ 5%ブドウ糖注射液 レボホリナート	250mL 25mg 100mg	1袋 200mg/m <sup>2</sup>	2時間	+5%ブドウ糖注射液 トポテシン	250mL 100mg/5mL 40mg/2mL	1袋 150mg/m <sup>2</sup>	2時間	
⑥ 生食 5FU	50mL 250mg/5mL	1瓶 400mg/m <sup>2</sup>	5分					
⑦ 生食 5FU	500mL 250mg/5mL	1袋 2400mg/m <sup>2</sup>	(外来はインフューザーポンプ使用) 46時間					

投与期間 2週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続