

# panitumumab+FOLFIRI Non bolus (大腸癌)

1日目

2～3日目

| メインルート                 |                                  |                             |                           | 側管                   |                                |                            | 内服  |                      |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|
| 薬剤名                    | 規格                               | 数量                          |                           | 薬剤名                  | 規格                             | 数量                         |     | デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後 |
| ① 生食<br>※インラインフィルター使用  | 50mL                             | 1瓶                          | 15分                       |                      |                                |                            |     |                      |
| ② 生食<br>ベクティビックス       | 100mL<br>100mg/5mL               | 1瓶<br>6mg/kg                | 1時間                       |                      |                                |                            |     |                      |
| ③ 生食                   | 100mL                            | 1瓶                          | 30分                       |                      |                                |                            |     |                      |
| ④ 生食<br>アロキシ<br>デキサート  | 100mL<br>0.75mg/5mL<br>3.3mg/1mL | 1瓶<br>1V<br>3A              | 30分                       |                      |                                |                            |     |                      |
| ⑤ 5%ブドウ糖注射液<br>レボホリナート | 250mL<br>25mg<br>100mg           | 1袋<br>200mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                       | + 5%ブドウ糖注射液<br>トポテシン | 250mL<br>100mg/5mL<br>40mg/2mL | 1袋<br>150mg/m <sup>2</sup> | 2時間 |                      |
| ⑥ 生食<br>5FU            | 500mL<br>250mg/5mL               | 1袋<br>2400mg/m <sup>2</sup> | (外来はインフューザーポンプ使用)<br>46時間 |                      |                                |                            |     |                      |

投与期間 2週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続