

# AP(EPI+CDDP)療法 short hydration(子宮体癌)

2~4日目

1日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

メインルート			
薬剤名	規格	数量	
① 生食	250mL	1袋	1時間
② 生食 プロイメンド点滴静注	100mL 150mg	1瓶 1瓶	30分
③ 生食 パロノセトロン デキサート	100mL 0.75mg/5mL 3.3mg/1mL	1瓶 1瓶 3A	30分
④ 生食 エピルビシン	100mL 50mg/25mL 10mg/5mL	1瓶 60mg/m <sup>2</sup>	15分
⑤ 生食	50mL	1瓶	5分
⑥ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 50mg/m <sup>2</sup>	2時間
⑦ 生食 ランツクス	50mL 20mg/2mL	1瓶 1A	5分
⑧ 生食	500mL	1袋	1時間30分

**投与期間** 4週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続

※点滴開始前～点滴終了後(帰宅後)、2-3日目、1000mLを目安に飲水(OS-1など望ましい)  
外来へ移行する前に入院にて安全性の確認を行う。