

# MEA療法（絨毛癌）

1日目	2日目	3日目	4日目																																																																																																																																																																					
	筋肉注射 ロイコボリン15mg/body 1日2回 10時 22時	筋肉注射 ロイコボリン 15mg/body 1日1回 10時																																																																																																																																																																						
メインルート	メインルート	メインルート	メインルート																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>規格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>アロキシ</td> <td>0.75mg/5ml</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>3.3mg/1ml</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td>② 生食</td> <td>50mL</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>③ 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>コスメゲン注</td> <td>0.5mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>蒸留水</td> <td>20mL</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)</td> </tr> <tr> <td>④ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>⑤ 5%TZ</td> <td>250ml</td> <td>1V 1時間</td> </tr> <tr> <td>ペプシド注</td> <td>100mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>⑥ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>⑦ 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>メソトレキセート</td> <td>50mg</td> <td>3V</td> </tr> <tr> <td>⑧ 生食</td> <td>500ml</td> <td>1V 4時間</td> </tr> <tr> <td>メソトレキセート</td> <td>50mg</td> <td>6V</td> </tr> <tr> <td>⑨ EL3号</td> <td>500ml</td> <td>1V 8時間</td> </tr> <tr> <td>⑩ EL3号</td> <td>500ml</td> <td>1V 8時間</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	規格	数量	① 生食	100ml	1V 30分	アロキシ	0.75mg/5ml	1V	デキサート	3.3mg/1ml	3A	② 生食	50mL	1V 15分	③ 生食	100ml	1V 30分	コスメゲン注	0.5mg	1V	蒸留水	20mL	1A	蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)			④ 生食	50ml	1V 15分	⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間	ペプシド注	100mg	1V	⑥ 生食	50ml	1V 15分	⑦ 生食	100ml	1V 30分	メソトレキセート	50mg	3V	⑧ 生食	500ml	1V 4時間	メソトレキセート	50mg	6V	⑨ EL3号	500ml	1V 8時間	⑩ EL3号	500ml	1V 8時間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>規格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>3.3mg/1ml</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td>② 生食</td> <td>50mL</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>③ 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>コスメゲン注</td> <td>0.5mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>蒸留水</td> <td>20mL</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)</td> </tr> <tr> <td>④ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>⑤ 5%TZ</td> <td>250ml</td> <td>1V 1時間</td> </tr> <tr> <td>ペプシド注</td> <td>100mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>⑥ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 5分</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	規格	数量	① 生食	100ml	1V 30分	デキサート	3.3mg/1ml	3A	② 生食	50mL	1V 15分	③ 生食	100ml	1V 30分	コスメゲン注	0.5mg	1V	蒸留水	20mL	1A	蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)			④ 生食	50ml	1V 15分	⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間	ペプシド注	100mg	1V	⑥ 生食	50ml	1V 5分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>規格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>3.3mg/1ml</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td>② 生食</td> <td>50mL</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>③ 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>コスメゲン注</td> <td>0.5mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>蒸留水</td> <td>20mL</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)</td> </tr> <tr> <td>④ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>⑤ 5%TZ</td> <td>250ml</td> <td>1V 1時間</td> </tr> <tr> <td>ペプシド注</td> <td>100mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>⑥ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 5分</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	規格	数量	① 生食	100ml	1V 30分	デキサート	3.3mg/1ml	3A	② 生食	50mL	1V 15分	③ 生食	100ml	1V 30分	コスメゲン注	0.5mg	1V	蒸留水	20mL	1A	蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)			④ 生食	50ml	1V 15分	⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間	ペプシド注	100mg	1V	⑥ 生食	50ml	1V 5分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>規格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>3.3mg/1ml</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td>② 生食</td> <td>50mL</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>③ 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>コスメゲン注</td> <td>0.5mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>蒸留水</td> <td>20mL</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)</td> </tr> <tr> <td>④ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>⑤ 5%TZ</td> <td>250ml</td> <td>1V 1時間</td> </tr> <tr> <td>ペプシド注</td> <td>100mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>⑥ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 5分</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	規格	数量	① 生食	100ml	1V 30分	デキサート	3.3mg/1ml	3A	② 生食	50mL	1V 15分	③ 生食	100ml	1V 30分	コスメゲン注	0.5mg	1V	蒸留水	20mL	1A	蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)			④ 生食	50ml	1V 15分	⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間	ペプシド注	100mg	1V	⑥ 生食	50ml	1V 5分
薬剤名	規格	数量																																																																																																																																																																						
① 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
アロキシ	0.75mg/5ml	1V																																																																																																																																																																						
デキサート	3.3mg/1ml	3A																																																																																																																																																																						
② 生食	50mL	1V 15分																																																																																																																																																																						
③ 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
コスメゲン注	0.5mg	1V																																																																																																																																																																						
蒸留水	20mL	1A																																																																																																																																																																						
蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)																																																																																																																																																																								
④ 生食	50ml	1V 15分																																																																																																																																																																						
⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間																																																																																																																																																																						
ペプシド注	100mg	1V																																																																																																																																																																						
⑥ 生食	50ml	1V 15分																																																																																																																																																																						
⑦ 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
メソトレキセート	50mg	3V																																																																																																																																																																						
⑧ 生食	500ml	1V 4時間																																																																																																																																																																						
メソトレキセート	50mg	6V																																																																																																																																																																						
⑨ EL3号	500ml	1V 8時間																																																																																																																																																																						
⑩ EL3号	500ml	1V 8時間																																																																																																																																																																						
薬剤名	規格	数量																																																																																																																																																																						
① 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
デキサート	3.3mg/1ml	3A																																																																																																																																																																						
② 生食	50mL	1V 15分																																																																																																																																																																						
③ 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
コスメゲン注	0.5mg	1V																																																																																																																																																																						
蒸留水	20mL	1A																																																																																																																																																																						
蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)																																																																																																																																																																								
④ 生食	50ml	1V 15分																																																																																																																																																																						
⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間																																																																																																																																																																						
ペプシド注	100mg	1V																																																																																																																																																																						
⑥ 生食	50ml	1V 5分																																																																																																																																																																						
薬剤名	規格	数量																																																																																																																																																																						
① 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
デキサート	3.3mg/1ml	3A																																																																																																																																																																						
② 生食	50mL	1V 15分																																																																																																																																																																						
③ 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
コスメゲン注	0.5mg	1V																																																																																																																																																																						
蒸留水	20mL	1A																																																																																																																																																																						
蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)																																																																																																																																																																								
④ 生食	50ml	1V 15分																																																																																																																																																																						
⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間																																																																																																																																																																						
ペプシド注	100mg	1V																																																																																																																																																																						
⑥ 生食	50ml	1V 5分																																																																																																																																																																						
薬剤名	規格	数量																																																																																																																																																																						
① 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
デキサート	3.3mg/1ml	3A																																																																																																																																																																						
② 生食	50mL	1V 15分																																																																																																																																																																						
③ 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
コスメゲン注	0.5mg	1V																																																																																																																																																																						
蒸留水	20mL	1A																																																																																																																																																																						
蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)																																																																																																																																																																								
④ 生食	50ml	1V 15分																																																																																																																																																																						
⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間																																																																																																																																																																						
ペプシド注	100mg	1V																																																																																																																																																																						
⑥ 生食	50ml	1V 5分																																																																																																																																																																						
	5日目	6-7日目																																																																																																																																																																						
	メインルート	内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>規格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>3.3mg/1ml</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td>② 生食</td> <td>50mL</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>③ 生食</td> <td>100ml</td> <td>1V 30分</td> </tr> <tr> <td>コスメゲン注</td> <td>0.5mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>蒸留水</td> <td>20mL</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)</td> </tr> <tr> <td>④ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 15分</td> </tr> <tr> <td>⑤ 5%TZ</td> <td>250ml</td> <td>1V 1時間</td> </tr> <tr> <td>ペプシド注</td> <td>100mg</td> <td>1V</td> </tr> <tr> <td>⑥ 生食</td> <td>50ml</td> <td>1V 5分</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	規格	数量	① 生食	100ml	1V 30分	デキサート	3.3mg/1ml	3A	② 生食	50mL	1V 15分	③ 生食	100ml	1V 30分	コスメゲン注	0.5mg	1V	蒸留水	20mL	1A	蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)			④ 生食	50ml	1V 15分	⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間	ペプシド注	100mg	1V	⑥ 生食	50ml	1V 5分																																																																																																																																			
薬剤名	規格	数量																																																																																																																																																																						
① 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
デキサート	3.3mg/1ml	3A																																																																																																																																																																						
② 生食	50mL	1V 15分																																																																																																																																																																						
③ 生食	100ml	1V 30分																																																																																																																																																																						
コスメゲン注	0.5mg	1V																																																																																																																																																																						
蒸留水	20mL	1A																																																																																																																																																																						
蒸留水1.1mLで溶解して0.5mg/1mL(過量充填あり)																																																																																																																																																																								
④ 生食	50ml	1V 15分																																																																																																																																																																						
⑤ 5%TZ	250ml	1V 1時間																																																																																																																																																																						
ペプシド注	100mg	1V																																																																																																																																																																						
⑥ 生食	50ml	1V 5分																																																																																																																																																																						
		投与期間	3週間毎																																																																																																																																																																					