

# BEP療法（胚細胞腫瘍）

6～7日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

3～5日目

1日目				2日目				3～5日目				
メインルート				側管				メインルート				
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		
① 生食	500mL	1袋	2時間	① 生食	500mL	1袋	2時間	① 生食	500mL	1袋	2時間	
② 生食 プロイメンド点滴静注	100mL 150mg	1瓶 1瓶	30分	② 生食 デキサート	100mL 3.3mg/1mL	1瓶 3A	30分	② 生食 デキサート	100mL 3.3mg/1mL	1瓶 3A	30分	
③ 生食 アロキン デキサート	100mL 0.75mg/5mL 3.3mg/1mL	1瓶 1瓶 3A	30分	③ 5%ブドウ糖注射液 ペプシド注	500mL 100mg	1袋 100mg/㎡	2時間	③ 5%ブドウ糖注射液 ペプシド注	500mL 100mg	1袋 100mg/㎡	2時間	
④ 5%ブドウ糖注射液 ペプシド注	500mL 100mg	1袋 100mg/㎡	2時間	④ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 20mg/㎡	2時間	④ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 20mg/㎡	2時間	
⑤ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 20mg/㎡	2時間	⑤ 生食 ラシックス	50mL 20mg/2mL	1瓶 1A	5分	⑤ 生食 ラシックス	50mL 20mg/2mL	1瓶 1A	5分	
⑥ 生食 ラシックス	50mL 20mg/2mL	1瓶 1A	5分	⑥ EL3号	500mL	1袋	5時間 + 生食 プレオ注 20mL 15mg 1A(10mL使用) 20mg/㎡(上限30mg) (持続皮下注)	24時間	⑥ EL3号	500mL	1袋	5時間
⑦ EL3号	500mL	1袋	5時間	⑦ EL3号	500mL	1袋	6時間	⑦ EL3号	500mL	1袋	6時間	
⑧ EL3号	500mL	1袋	6時間	⑧ EL3号	500mL	1袋	6時間	⑧ EL3号	500mL	1袋	6時間	
⑨ EL3号	500mL	1袋	6時間									

6～7日目

8日目

9日目 16日目

6～7日目				8日目				9日目 16日目			
メインルート				メインルート				メインルート			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① EL3号	500mL	1袋	6時間	① EL3号	500mL	1袋	3時間	① 生食 プレオ注 20mL 15mg 1A(10mL使用) 20mg/㎡(上限30mg) (持続皮下注)	24時間		
② EL3号	500mL	1袋	6時間	② EL3号	500mL	1袋	3時間				
③ EL3号	500mL	1袋	6時間	③ EL3号	500mL	1袋	3時間				
④ EL3号	500mL	1袋	6時間	④ EL3号	500mL	1袋	3時間				

投与期間

3週間ごと2～4クール