

TI療法（子宮癌肉腫）

1日目

内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用

1日目

メインルート				側管			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① 生食	100ml	1V	30分				
デキサート	3.3mg/1ml	5A					
ファモチジン	20mg	1V					
※インラインフィルター使用							
② 生食	100mL	1V	30分				
アロキシ	0.75mg/5ml	1V					
③ 5%TZ	500ml	1V	3時間				
パクリタキセル	100mg/16.7ml	135mg/m ²					
	30mg/5ml						
④ 生食	50ml	1V	5分	+ ウロミテキサン注	400mg/4ml	300mg/m ²	1分
				((⑤開始直前))			
⑤ 生食	500ml	1V	2時間				
イホマイド	1g	1.6g/m ²					
⑥ 生食	500ml	1V	2時間				
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V					
⑦ EL3号	500ml	1V	2時間	+ ウロミテキサン注	400mg/4ml	300mg/m ²	1分
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V		((⑤開始後4時間))			
⑧ EL3号	500ml	1V	2時間				
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V					
⑨ EL3号	500ml	1V	6時間	+ ウロミテキサン注	400mg/4ml	300mg/m ²	1分
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V		((⑤開始後8時間))			
⑩ EL3号	500ml	1V	6時間				
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V					

2~3日目

メインルート				側管			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① 生食	100ml	1V	30分				
デキサート	3.3mg/1ml	2A					
② 生食	50ml	1V	5分	+ ウロミテキサン注	400mg/4ml	300mg/m ²	1分
				((③開始直前))			
③ 生食	500ml	1V	2時間				
イホマイド	1g	1.6g/m ²					
④ 生食	500ml	1V	2時間				
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V					
⑤ EL3号	500ml	1V	2時間	+ ウロミテキサン注	400mg/4ml	300mg/m ²	1分
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V		((③開始後4時間))			
⑥ EL3号	500ml	1V	2時間				
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V					
⑦ EL3号	500ml	1V	2時間	+ ウロミテキサン注	400mg/4ml	300mg/m ²	1分
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V		((③開始後8時間))			
⑧ 生食	50ml	1V	5分				

投与期間 3週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続