

# TIP療法（胚細胞腫瘍）

1日目

**内服** レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用

1日目

メインルート			側管	メインルート		
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	
① 生食	100ml	1V				
プロイメンド点滴静注	150mg	1V				
② 生食	100ml	1V				
デキサート	3.3mg/1ml	5A				
ファモチジン	20mg	1V				
※インラインフィルター使用						
③ 生食	100mL	1V				
アロキシ	0.75mg/5ml	1V				
④ 5%TZ	500ml	1V				
バクリタキセル	100mg/16.7ml	175mg/m <sup>2</sup>				
	30mg/5ml					
⑤ 生食	50ml	1V	5分	+	ウロミテキサン注 400mg/4ml 200mg/m <sup>2</sup> 1分	
					(⑥開始直前) フィルターを通さない	
⑥ 生食	500ml	1V	2時間			
イホマイド	1g	1.0g/m <sup>2</sup>				
⑦ 生食	500ml	1V	2時間			
シスプラチン	50mg/100ml	20mg/m <sup>2</sup>				
	25mg/50ml					
	10mg/20ml					
⑧ EL3号	500ml	1V	2時間	+	ウロミテキサン注 400mg/4ml 200mg/m <sup>2</sup> 1分	
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V			(⑥開始後4時間) フィルターを通さない	
⑨ EL3号	500ml	1V	2時間			
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V				
⑩ EL3号	500ml	1V	6時間	+	ウロミテキサン注 400mg/4ml 200mg/m <sup>2</sup> 1分	
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V			(⑥開始後8時間) フィルターを通さない	
⑪ EL3号	500ml	1V	6時間			
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V				

2~5日目

メインルート				メインルート		
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量
① 生食	100ml	1V	30分			
デキサート	3.3mg/1ml	3A				
② 生食	50ml	1V	5分	+	ウロミテキサン注 400mg/4ml 200mg/m <sup>2</sup> 1分	
					(③開始直前)	
③ 生食	500ml	1V	2時間			
イホマイド	1g	1.0g/m <sup>2</sup>				
④ 生食	500ml	1V	2時間			
シスプラチン	50mg/100ml	20mg/m <sup>2</sup>				
	25mg/50ml					
	10mg/20ml					
⑤ EL3号	500ml	1V	2時間	+	ウロミテキサン注 400mg/4ml 200mg/m <sup>2</sup> 1分	
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V			(③開始後4時間)	
⑥ EL3号	500ml	1V	2時間			
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V				
⑦ EL3号	500ml	1V	2時間	+	ウロミテキサン注 400mg/4ml 200mg/m <sup>2</sup> 1分	
炭酸水素Na静注7%	20ml	1V			(③開始後8時間)	

投与期間 3週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続