

VIP療法（胚細胞腫瘍）

1日目

メインルート			側管		
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量
① 生食 プロイメンド点滴静注	100ml 150mg	1V 1V			30分
② 生食 アロキシ デキサート	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml	1V 1V 3A			30分
③ 5%TZ ペブシド	500ml 100mg/16.7ml 30mg/5ml	1V 75mg/m ²			2時間
④ 生食	50ml	1V	+ ウロミテキサン注 (⑤開始直前)	400mg/4ml	240mg/m ² 1分
⑤ 生食 イホマイド	500ml 1g	1V 1.2g/m ²			2時間
⑥ 生食 シスプラチン	500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml	1V 20mg/m ²			2時間
⑦ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V	+ ウロミテキサン注 (⑤開始後4時間)	400mg/4ml	240mg/m ² 1分
⑧ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V			2時間
⑨ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V	+ ウロミテキサン注 (⑤開始後8時間)	400mg/4ml	240mg/m ² 1分
⑩ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V			6時間

2～5日目

メインルート			薬剤名			規格			数量		
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量
① 生食 デキサート	100ml 3.3mg/1ml	1V 3A			30分						
② 5%TZ ペブシド	500ml 100mg/16.7ml 30mg/5ml	1V 75mg/m ²			2時間						
③ 生食	50ml	1V	+ ウロミテキサン注 (④開始直前)	400mg/4ml	240mg/m ² 1分						
④ 生食 イホマイド	500ml 1g	1V 1.2g/m ²			2時間						
⑤ 生食 シスプラチン	500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml	1V 20mg/m ²			2時間						
⑥ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V	+ ウロミテキサン注 (④開始後4時間)	400mg/4ml	240mg/m ² 1分						
⑦ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V			2時間						
⑧ EL3号 炭酸水素Na静注7%	500ml 20ml	1V 1V	+ ウロミテキサン注 (④開始後8時間)	400mg/4ml	240mg/m ² 1分						

投与期間 3週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続