

2回目以降Cetuximab+FP（頭頸部癌）

1日目						2～4日目								
内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用						内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後								
1日目						2～4日目								
メインルート			側管			メインルート			側管					
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量			
① 生食 プロイメド	100ml 150mg	1V 1V			30分	① 生食 5FU	500ml 250mg/5ml	1V 1000mg/m ²			24時間			
② 生食 アロキシ デキサート ファモチジン	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml 20mg	1V 1V 3A 1V			30分									
③ 生食 アービタックス	250ml 100mg/20ml	1V 250mg/m ²			1時間									
④ 生食	100ml	1V			1時間									
⑤ 生食 5FU	500ml 250mg/5ml	1V 1000mg/m ²	+ EL3号	500ml	1V 2時間	① 生食 デキサート ファモチジン	100ml 3.3mg/1ml 20mg	1V 2A 1V			30分			
(24時間)			+ マンニトールS	300ml	1V 30分	② 生食 アービタックス	250ml 100mg/20ml	1V 250mg/m ²			1時間			
			+ 生食 シスプラチン	500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml	1V 2時間 100mg/m ²	③ 生食	100ml	1V			1時間			
			+ EL3号	500ml	1V 2時間									
						8、15日目								
						内服レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用								
						メインルート								
						薬剤名			規格			数量		
						① 生食 デキサート ファモチジン			100ml 3.3mg/1ml 20mg			1V 2A 1V		
						② 生食 アービタックス			250ml 100mg/20ml			1V 250mg/m ²		
						③ 生食			100ml			1V		
												1時間		

投与期間 3週間ごと

最高6クール