

# TPF (頭頸部癌)

1日目

内服			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用			
メインルート			
薬剤名	規格	数量	
① 生食	100ml	1V	30分
デキサート	3.3mg/1ml	5A	
② 生食	100ml	1V	30分
③ 5%TZ	250ml	1V	81分
ドセタキセル	80mg/4ml	60mg/m <sup>2</sup>	
	20mg/1ml		
点滴速度 ①50ml/hr 15分 ②100ml/hr 15分 ③250ml/hr 51分			
④ 生食	100ml	1V	60分
⑤ 生食	500ml	1V	24時間
5FU	250mg/5ml	750mg/m <sup>2</sup>	
	100mg/20ml		

2~3日目

メインルート					
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量
① 生食	500ml	1V	+ 生食	100ml	1V 30分
5FU	250mg/5ml	750mg/m <sup>2</sup>	デキサート	3.3mg/1ml	2A
	1000mg/20ml				
(24時間)					

4日目

メインルート			側管		
薬剤名	数量		薬剤名	規格	数量
① 生食	500ml	1V	+ 生食	250ml	1V 1時間
5FU	250mg/5ml	750mg/m <sup>2</sup>			
	1000mg/20ml		+ 生食	100ml	1V 30分
(24時間)			プロイメンド点滴静注	150mg	1V
			+ 生食	3mg/100ml	1V 30分
			アロキシ	0.75mg/5ml	1V
			デキサート	3.3mg/1ml	3A
			+ マニトールS	300ml	1V 30分
			+ 生食	500ml	1V 2時間
			シスプラチン	50mg/100ml	70mg/m <sup>2</sup>
				25mg/50ml	
				10mg/20ml	
			+ EL3号	500ml	1V 2時間

5~7日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

5日目

メインルート		
薬剤名	規格	数量
① 生食	500ml	1V
5FU	250mg/5ml	
	1000mg/20ml	750mg/m <sup>2</sup>
(24時間)		

投与期間 4週間ごと 3クール