

ramucirumab+PAC療法（胃癌）

1日目 15日目

内服			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用			
メインルート			
薬剤名	規格	数量	
① 生食 ※ インラインフィルター使用	50ml	1V	15分
② 生食 デキサート ファモチジン	100ml 3.3mg/1ml 20mg	1V 2A 1V	30分
③ 生食 サイラムザ	250ml 100mg/10ml 500mg / 50ml	1V	60分
④ 生食	100ml	1V	60分
⑤ 5%TZ パクリタキセル	250ml 30mg/5ml	1V	2時間 80mg/m ²
⑥ 生食	50ml	1V	5分

8日目

内服			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用			
メインルート			
薬剤名	規格	数量	
① 生食 デキサート ファモチジン ※ インラインフィルター使用	100ml 3.3mg/1ml 20mg	1V 2A 1V	30分
② 生食	100mL	1V	30分
③ 5%TZ パクリタキセル	250ml 30mg/5ml	1V	2時間 80mg/m ²
④ 生食	50mL	1V	5分

投与期間 4週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続