

# GC (尿路上皮癌)

3日目～5日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

1日目				2日目			3日目			4日目			5日目		
メインルート				メインルート			メインルート			メインルート			メインルート		
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量
① 生食 デキサート	100ml 3.3mg/ml	1V 2A	30分	① EL3号	500ml	1V 8時間	① EL3号	500ml	1V 4時間	① EL3号	500ml	1V 6時間	① EL3号	500ml	1V 3時間
② 生食 ジェムザール	100ml 1g 200mg	1V	30分 時間厳守! 時間延長で有害事象増強	② 生食	500ml	1V 1.5時間	② EL3号	500ml	1V 4時間	② EL3号	500ml	1V 6時間	② EL3号	500ml	1V 3時間
③ 生食	500ml	1V	6時間	③ 生食 プロイメンド点滴静注	100ml 150mg	1V 30分	③ EL3号	500ml	1V 4時間	③ 生食	500ml	1V 6時間	③ 生食	500ml	1V 3時間
④ 生食	500ml	1V	6時間	④ 生食 アロキシ デキサート	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml	1V 30分 1V 3A	④ EL3号	500ml	1V 4時間	④ 生食	500ml	1V 6時間			
				⑤ マンニトールS	300ml	1V 30分	⑤ 生食	500ml	1V 4時間						
				⑥ 生食 シスプラチン	500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml	1V 2時間 70mg/m <sup>2</sup>	⑥ 生食	500ml	1V 4時間						
				⑦ 生食	500ml	1V 2時間									
				⑧ EL3号	500ml	1V 9時間									

8日目 15日目

メインルート			
薬剤名	規格	数量	
① 生食 デキサート	100ml 3.3mg/1ml	1V 2A	30分
② 生食 ジェムザール	100ml 1g 200mg	1V	30分 時間厳守! 時間延長で有害事象増強
③ 生食	50ml	1V	5分

投与期間 4週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続