

# PAV（乏突起膠腫）

1日目

2～3日目

メインルート				内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後			
薬剤名	規格	数量					
① 生食	100ml	1V	30分				
アロキシ	0.75mg/5ml	1V					
デキサート	3.3mg/1ml	3A					
② 5%TZ	250ml	1V	60分				
ニドラン	50mg	75mg/m <sup>2</sup>					
③ 生食	50ml	1V	5分				

8～21日目

**内服** 塩酸プロカルバジンカプセル50mg 100mg/m<sup>2</sup>/日 1日1回朝食後  
※ 初日は点滴抗がん剤が終了後に服用

9～21日目

**内服** カイトリル錠2mg 1錠 1日1回朝食前

8日目

メインルート				側管			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① 生食	100ml	1V	30分				
プロイメンド点滴静注	150mg	1V					
② 生食	50ml	1V	30分				
カイトリル	1mg/1ml	1A					
デキサート	3.3mg/1ml	3A					
③ 生食	100ml	1V	30分	+ 生食	20ml	1A	1分
				オンコビン	1mg	1mg/m <sup>2</sup>	
							(上限2mg)

29日目

メインルート				側管			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① 生食	100ml	1V	30分	+ 生食	20ml	1A	1分
				オンコビン	1mg	1mg/m <sup>2</sup>	
							(上限2mg)

投与期間 6週間ごと 3-6クール