

# DG療法（子宮平滑筋肉腫）

1日目

| メインルート |              |                      |                            |                                     |
|--------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|        | 薬剤名          | 規格                   | 数量                         |                                     |
| ①      | 生食<br>デキサート  | 100ml<br>3.3mg/1ml   | 1V<br>2A                   | 30分                                 |
| ②      | 生食<br>ジェムザール | 100ml<br>200mg<br>1g | 1V<br>900mg/m <sup>2</sup> | 30分<br><b>時間厳守！<br/>時間延長で有害事象増強</b> |
| ③      | 生食           | 50ml                 | 1V                         | 5分                                  |

8日目

| メインルート  |                |                      |                                       |                                     |
|---|----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|   | 薬剤名            | 規格                   | 数量                                    |                                     |
| ①   | 生食<br>デキサート    | 100ml<br>3.3mg/1ml   | 1V<br>5A                              | 30分                                 |
| ②   | 生食<br>アロキシ     | 100ml<br>0.75mg/5ml  | 1V<br>1V                              | 30分                                 |
| ③   | 5%TZ<br>ドセタキセル | 250ml<br>80mg/4ml    | 1V<br>75mg/m <sup>2</sup><br>20mg/1ml | 81分                                 |
| 点滴速度 ①50ml/hr 15分 ②100ml/hr 15分 ③250ml/hr 51分 |                |                      |                                       |                                     |
| ④   | 生食<br>ジェムザール   | 100ml<br>200mg<br>1g | 1V<br>900mg/m <sup>2</sup>            | 30分<br><b>時間厳守！<br/>時間延長で有害事象増強</b> |
| ⑤   | 生食             | 50ml                 | 1V                                    | 5分                                  |

9～10日目

| 内服           |         |
|--------------|---------|
| デカドロン錠4mg 2錠 | 1日1回朝食後 |

投与期間

3週間ごと

重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続