

# DOC+CDGP (進行・再発食道癌)

1日目

2~3日目

| 1日目   |                     |                                  |                           | 2~3日目                      |  |     |  |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----|--|
| 内服<br>レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用          |                     |                                  |                           | 内服<br>デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後 |  |     |  |
| メインルート  |                     |                                  |                           |                            |  |     |  |
|   | 薬剤名                 | 規格                               | 数量                        |                            |  |     |  |
| ①   | 生食<br>アロキシ<br>デキサート | 100ml<br>0.75mg/5ml<br>3.3mg/1ml | 1V<br>1V<br>5A            |                            |  | 30分 |  |
| ②   | 生食                  | 100ml                            | 1V                        |                            |  | 30分 |  |
| ③   | 5%TZ<br>ドセタキセル      | 250ml<br>20mg/1ml                | 1V<br>30mg/m <sup>2</sup> |                            |  | 81分 |  |
| 点滴速度 ①50ml/hr 15分 ②100ml/hr 15分 ③250ml/hr 51分 |                     |                                  |                           |                            |  |     |  |
| ④   | 生食<br>アクプラ          | 500ml<br>10mg<br>50mg            | 1V<br>40mg/m <sup>2</sup> |                            |  | 90分 |  |
| ⑤   | EL3号                | 500ml                            | 1V                        |                            |  | 2時間 |  |
| ⑥   | EL3号                | 500ml                            | 1V                        |                            |  | 2時間 |  |

投与期間 2週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続